

TIETO-/SUOSTUMUSLOMAKE ETURAUHASEN KOEPALAN OTTAMISEKSI

Terveyttenne tutkimiseksi on tarpeellista tehdä eturauhasen koepalatutkimus, joka tehdään Pärnun sairaalan radiologian osastolla BC-rakennuksen 2. kerroksessa.

Mitä tarkoittaa koepalan ottaminen eturauhasesta?

Koepalan eli biopsian ottaminen eturauhasesta, kun peräsuolen kautta tehtävässä eturauhasen tunnustelussa tai jossain muussa tutkimuksessa (esim. eturauhaskokeen arvot koholla) on ilmennyt epäily pahanlaatuisesta kasvaimesta.

Valmistautuminen tutkimukseen

- Kertokaa lääkärillenne, jos käytätte verenohennuslääkkeitä tai jos olette allerginen puudutusaine lidokaiinille.
- Älkää käytäkö kolmea päivää ennen toimenpidettä tulehduslääkkeitä tai särkylääkkeitä (ibuprofeeni yms.), jotta vältetään verenvuodon riski toimenpiteen aikana tai sen jälkeen.
- Alkakaikaa ottaa 48 tuntia ennen toimenpidettä lääkärinne teille määräämiä antibiootteja, jotta voidaan välttää tulehdus.
- Ennen toimenpidettä tyhjentäkää peräsuolenne. Ummetustapauksessa voitte ottaa myös peräruiskeen.

Toimenpiteen luonne

Toimenpiteen aikana makaatte vasemmalla kyljellänne, polvet koukussa. Ultraäänilaite viedään peräsuoleen. Laitteen sivussa on koepalan ottava biopsialaite. Yleensä toimenpide ei ole erityisen kivulias. Jonkinlaista epämukavuuden tunnetta voi tuntua alavatsassa ja peräsuolen alueella. Ultraäänikuvauksen aikana otetaan biopsialaitteella peräsuolen limakalvon läpi vähintään 12 koepalaa, jotka lähetetään laboratorioon analysoitaviksi.

Toimenpiteen jälkeen

Toimenpidepäivänä ei ole suositeltavaa tehdä fyysistä työtä, käyttää alkoholia, käydä saunassa tai kylvyssä. Suihkussa voi käydä. Seksin harrastamista on suositeltavaa välttää 2–3 päivän ajan. Kun tutkimuksesta on kulunut noin kaksi viikkoa, ilmoittaa lääkäri teille tutkimuksen tulokset ja suunniteltavan jatkohoidon.

Mahdolliset haittavaikutukset

Välittömästi toimenpiteen jälkeen ja muutama päivä sen jälkeen voi esiintyä verta virtsassa ja vähäistä verenvuotoa peräsuolesta. Ejakulaation jälkeen voi spermassa olla verta.

Tulehdukseen viittaava kivulias virtsaaminen tai virtsaamisvaikeus johtuvat eturauhasen väliaikaisesta turvotuksesta. Ilmetä voi myös kuumetta. Tällaisten jälkioireiden ilmetessä hakeutukaa heti päivystykseen.

Potilaan suostumus

Vakuutan lukeneeni tämän tiedotteen ja ymmärtäneeni sen sisällön täysin. Vahvistan minulle kerrotun eturauhasesta koepalan ottamisen toimenpiteestä ja sen mahdollisista riskeistä. Tähän perustuen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Suostun edellä mainittuun toimenpiteeseen. | <input type="checkbox"/> Kieltäydyn edellä mainitusta toimenpiteestä ollen tietoinen sen tekemättä jättämisestä seuraavista mahdollisista seurauksista. |
|---|---|

(Vastaus merkitään rastilla **x**) ruutuun.)

Potilaan (edustajan) etu- ja sukunimi:

Päivämäärä:

Allekirjoitus:

Olen kertonut kyseessä olevalle henkilölle tietokonetomografisen tutkimuksen toimenpiteestä ja selostanut siihen liittyvän tiedotteen sisältöä.

Etu- ja sukunimi:

Päivämäärä:

Ammattinimike

Allekirjoitus